


Reporte mensual de Emergencias Epidemiológicas

Semana Epidemiológica N°6
Corte :13 de febrero del 2026

Nota Editorial



	Pág.
<u>Nota Editorial</u>	<u>1</u>
<u>Riesgos en Evolución:</u>	
• <u>Sarampión</u>	<u>2</u>
• <u>Tosferina</u>	<u>5</u>
• <u>Influenza estacional</u>	<u>6</u>
• <u>COVID-19</u>	<u>6</u>
<u>Alertas y Actualizaciones Epidemiológicas</u>	<u>7</u>

Desde 2016 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró la Región de las Américas como libre de sarampión, eso significa que no había una transmisión (o contagios) continuos, también implica que el Sistema de Vigilancia era fuerte y las coberturas de vacunación altas, cabe mencionar que el último caso autóctono en México se presentó en 1995.

El 14 de febrero del 2025 que inició el brote de sarampión en México al corte de la información se han reportado **9,351** casos y **28** defunciones. Por ello, la OPS ha otorgado a México una prórroga de 2 meses para contener el brote y no perder la certificación internacional como país libre de sarampión.

Es muy importante que todos participemos para evitar que el brote siga expandiéndose, se le pide a la comunidad en todos los Estados estar atenta a los avisos e indicaciones que las autoridades de salud emitan para contener el brote. **Principalmente asistir a los centros de vacunación para completar su esquema.** [Se recomienda leer la nota “Estado del sarampión en México” publicado en la Gaceta UNAM al momento.](#)

Riesgos en evolución

Sarampión

Semana Epidemiológica N°6
Corte :13 de febrero del 2026

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa en personas no vacunadas. Se transmite vía aérea, y se propaga fácilmente cuando se tiene contacto con una persona infectada o cuando el enfermo respira, tose o estornuda.


En México, la Secretaria de Salud ha reportado:

9,351
Casos


28
Defunciones

Vacunarse evita contraer el sarampión o contagiarlo a otras personas. La vacuna contra el sarampión se conoce como SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) o SR (Sarampión y Rubéola), ambas son seguras, en caso de contagio los síntomas suelen ser leves.

[Regresar al Índice](#)




Gráfica 1. Curva epidémica de casos de sarampión por semana epidemiológica de inicio de exantema, México, 2025-2026*



Secretaría de Salud, Informe Diario de Sarampión:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1056790/Informe_diario_12_02_2026.pdf




Alertas y Actualizaciones

Epidemiológicas

Semana Epidemiológica N°6
Corte :13 de febrero del 2026

[Regresar al Índice](#)



Sarampión

Región de las Américas

[Alerta Epidemiológica Sarampión en la Región de las Américas](#)

29 enero 26

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) emiten una alerta epidemiológica de sarampión en la Región de las Américas debido al incremento de casos que se han reportado durante el 2025 y principios de 2026.

Se recomienda priorizar las actividades de vigilancia y vacunación, así mismo, implementar búsquedas activas en comunitarias, institucionales y de laboratorio para identificar casos.

Sarampión

México

[Sarampión en el mundo: ¿qué está provocando el repunte de contagios?: esto dice la UNAM](#)

29 enero 26

El reciente incremento de casos de sarampión en diversas regiones del mundo ha encendido las alertas de las autoridades sanitarias globales. Ante este escenario, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han analizado las causas detrás de este fenómeno, advirtiendo que la enfermedad, lejos de estar erradicada, presenta un riesgo latente debido a la disminución en las coberturas de vacunación a nivel internacional.

Samuel Ponce de León Rosales y Rosa María Wong Chew, expertos de la UNAM, identifican la caída en la inmunización como el factor determinante del repunte. Para frenar la transmisión del virus, se requiere una cobertura de vacunación de al menos el 95%; sin embargo, esta cifra ha descendido globalmente.




Alertas y Actualizaciones

Epidemiológicas

Semana Epidemiológica N°6
Corte :13 de febrero del 2026

[Regresar al Índice](#)



Sarampión

México

[Mitos y verdades del sarampión](#)

[¿Por qué no vacunan a mayores de 50 años?](#)

10 febrero 26

El sarampión se contagia por las partículas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar, por ello las medidas preventivas como el uso de cubrebocas ayudan a evitar contagios, a la par, de seguir aumentando el número de personas vacunadas para hacer frente a esta epidemia. También es importante tomar otras medidas como, aislar a la persona enferma, buena ventilación y mantener una buena higiene de manos y de superficies.

Mauricio Rodríguez, experto de la UNAM, mencionó que las personas mayores de 50 años están protegidas por haber vivido su infancia en un momento en el que el sarampión circulaba de manera constante.

Sarampión

México

[Recomendaciones para establecer filtros sanitarios en planteles escolares del estado de México para detección de sarampión y uso de cubrebocas](#)

8 febrero 26

El Estado de México publicó las medidas dirigidas a las autoridades educativas estatales y municipales.

1. Vacunación.
2. Establecimiento de filtro sanitarios diarios en todas las entradas de los planteles.
3. Uso de cubrebocas.
4. Capacitación para el personal designado para la identificación de síntomas.
5. Comunicación.
6. Monitoreo y reporte para seguimiento de las actividades.
7. Medidas complementarias, ventilación adecuada en aulas, lavado de manos e higiene respiratoria.

Riesgos en evolución

Tos ferina

Semana Epidemiológica N°6
Corte :13 de febrero del 2026

La tos ferina, es una infección respiratoria aguda altamente contagiosa causada por la bacteria *Bordetella pertussis*. Es una enfermedad prevenible por vacunación (consulte las vacunas disponibles para su edad).


El 23 de mayo de 2025 la Secretaria de Salud, publicó un aviso epidemiológico sobre el aumento de casos en México y el 31 de mayo, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), emitió una alerta epidemiológica, alentando a fortalecer actividades de vigilancia y a mantener un monitoreo constante de las coberturas de vacunación en niños menores de 1 año y menores de 5 años.

En México se han notificado entre el 2025 y 2026:

1,596
Casos

72
Defunciones

[Regresar al Índice](#)





Aviso Epidemiológico

CONAVE/06/2025/Tos ferina
23 de mayo del 2025

Aumento de casos de Tos ferina en México

Para: Todas las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención, Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) e integrantes de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP)

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) informa sobre el aumento de casos de Tos ferina en México:

La Tos ferina, es una infección respiratoria aguda altamente contagiosa causada por la bacteria *Bordetella pertussis*.

Transmisión:
El mecanismo de transmisión es mediante contacto directo con gotitas de las personas infectadas al toser o estornudar.

Cuadro clínico:
El periodo de incubación es de siete a 10 días y las manifestaciones clínicas pueden durar hasta seis u ocho semanas. La sintomatología se clasifica en tres fases con respecto al tiempo de la enfermedad: Fase

Riesgos en evolución

Influenza Estacional

Semana Epidemiológica N°6
Corte :13 de febrero del 2026

El acumulado de la temporada de influenza estacional del año **2026**, hasta el corte de información, se han confirmado a influenza por laboratorio :

4,337
Casos

54
Defunciones


El 48% son debido a influenza A (H1N1), **sobresale el 40% por influenza A (H3N2)** que no es habitual, el 10% por influenza A y el 3% por influenza B.

Al comparar el comportamiento de los casos en el Sistema de Notificación Semanal de casos nuevos (SUAVE) durante de la temporada de influenza estacional a la misma fecha de corte del año 2025 se observa un decremento de -2 % en los casos de IRA y un incremento de 1.1 % en los casos de neumonía y bronconeumonía.

Riesgos en evolución

COVID-19

[Regresar al Índice](#)



De acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER) **en el 2026** se reportaron 20,104 casos sospechosos, los cuales se han confirmado por RT-PCR:

126
Casos

7
Defunciones


Al comparar la curva epidémica de casos del 2026 con los últimos seis años, con información de casos confirmados por RT-PCR, se observa una carga de enfermedad menor. Al comparar la información preliminar acumulada de 2026 con la de 2025 a la misma semana, se reporta el 39% menos de casos.

Alertas y Actualizaciones

Epidemiológicas

Semana Epidemiológica N°6
Corte :13 de febrero del 2026

[Regresar al Índice](#)



Influenza H3N2

México

[OPS emite alerta sobre circulación simultánea de influenza estacional y virus sincitial respiratorio en la región de las Américas](#)

10 enero 26

Debido a la circulación de simultánea de influenza estacional y virus sincitial respiratorio (VSR) la OPS recomienda a los países de la región de las Américas mantener la vigilancia y fortalecer los servicios de salud.

“Es muy importante priorizar la vacunación porque protege de tener casos graves que pueden requerir hospitalización, en conjunto mantener la vigilancia para actuar a tiempo a fin de prevenir brotes y evitar saturación en los hospitales”. Marc Rondy, asesor regional en epidemiología de enfermedades con potencial epidémico y pandémico de la OPS.

Virus de Nipah

India

[Virus de Nipah](#)

[Virus Nipah información](#)

29 enero 26

La última semana de diciembre se reportaron 2 casos de enfermeros trabajadores de un mismo Hospital. Al confirmar que era virus de Nipha, se implementaron acciones de respuesta, rastreo, identificación y monitoreo a 196 personas a quienes se les hicieron pruebas, todos dieron negativo al virus. India ha atendido otros brotes de este virus de forma efectiva.

Este virus es de origen zoonótico (se contagia de animales a humanos) se transmite por contacto cercano o por consumo de alimentos contaminados. El riesgo internacional del que se ha hablado por el consumo de fruta o productos contaminados con orina o saliva de murciélagos frugívoros infectados, puede evitarse al lavar y pelar la fruta que se consumirá. Otra medida es desechar la fruta que muestre signos de haber sido mordida por murciélagos.